岐阜市医師会センター　NEWS　12-14

平成 25 年 3 月

検査内容変更のお知らせ

謹啓　時下ますますご清栄のことと、お喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、4月1日（月）受付分から、下記のとおり検査内容が変更されますのでご案内いたします。ご迷惑をおかけしますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更日　２０１３年　４月　１日（月）　受付分から

1．ウィルス、感染症関連抗体価検査

ウィルス、感染症関連抗体価の基準値欄(最低希釈倍率)及び報告書基準値欄の表記が変更されます。ただし、抗体価での表記は基準値ではなく、各検査項目の検体の最低希釈倍率(未満)になります。また、これに伴う検査方法等の変更はありません。

＊ウィルス、感染症関連抗体価についての考え方
抗体は感染の結果生じたものであって、病原体の「足跡」と考えられ、病原体の実態とは関連しません。また個人差も大きいため、抗体価で病態を表わすことはできません。従って、抗体価検査に正常値、異常値、基準値という概念はありません。

【総合検査案内の基準値欄の表記】

○倍 ○倍希釈より実施 ○倍（最低希釈倍率）	→	○倍未満

【報告書の基準値欄の表記】

○倍希釈 より実施	→	○未満 （単位：倍）

2．現行試薬の添付文書により、基準値を変更させていただきます。

コード／検査項目名	（新）		（旧）
2477 AFPレクチン分画／ＬＢＡ	L3 分画：	10.0 未満　%	10.0 未満　%
	総 AFP 量：	10.0 以下 ng／ml	10.0 未満 ng／ml
4874 NCC-ST-439	男性及び 50 才以上の女性：	4.5 未満　U／ml	4.5 以下　U／ml
	女性 49 才以下：	7.0 未満　U／ml	7.0 以下　U／ml
897 トキソプラズマ抗体 IgG		（−） 6 未満　IU／ml	（−） 5 以下　IU／ml
898 トキソプラズマ抗体 IgM		（−） カットオフインデックス：　0.8 未満	（−） 0.7 以下
4800　BFP		75 未満　ng／ml	75 以下　ng／ml

より正確に！
　より迅速に！

地域に密着した検査体制　　岐阜市医師会臨床検査センター

3．特異的IgE（CAP - アレルゲン）

従来試薬販売中止のため、同一メーカーの改良試薬に変更されます。これに伴い、報告範囲が変更となります

報告範囲　（新）0.10未満から100以上　←　（旧）0.34以下～100以上

4．ソマトメジンC（IGF-Ⅰ）

【旧基準値】

年齢	男	女
0	18～150	12～174
1～2	11～172	37～229
3～4	29～173	35～238
5～6	64～203	74～230
7～8	50～356	95～437
9～10	87～405	60～514
11～12	115～545	206～731
13～14	178～686	216～798
15～16	287～555	262～510
17～19	219～509	264～542
20～29	85～369	119～389
30～39	67～318	73～311
40～49	41～272	46～282
50～59	59～215	37～266
60～69	42～250	37～150
70以上	75～218	38～207

（単位:ng/mL）

試薬メーカーにより基準値が変更となります。
以降、報告書の基準値欄には「検査案内参照」と記載されます。

【新基準値】

男性					
年齢	-2SD～+2SD	年齢	-2SD～+2SD	年齢	-2SD～+2SD
0	11～149	26	119～329	52	86～242
1	14～148	27	116～322	53	85～240
2	18～154	28	114～315	54	84～239
3	24～164	29	111～309	55	84～238
4	32～176	30	109～303	56	83～237
5	44～193	31	107～297	57	82～236
6	55～215	32	105～292	58	81～235
7	63～247	33	103～287	59	80～233
8	72～292	34	102～283	60	79～232
9	84～350	35	100～279	61	77～230
10	99～423	36	99～275	62	76～228
11	113～499	37	97～272	63	75～226
12	125～557	38	96～269	64	73～224
13	133～579	39	95～266	65	72～221
14	138～570	40	94～263	66	70～219
15	141～552	41	94～261	67	68～216
16	142～543	42	93～259	68	66～213
17	142～540	43	92～257	69	65～209
18	142～526	44	92～255	70	63～206
19	143～501	45	91～253	71	61～202
20	142～470	46	90～250	72	58～198
21	139～436	47	90～250	73	56～194
22	135～405	48	89～248	74	54～190
23	131～379	49	88～246	75	52～185
24	128～356	50	87～245	76	50～181
25	125～337	51	87～243	77	48～177

（単位:ng/mL）

女性					
年齢	-2SD～+2SD	年齢	-2SD～+2SD	年齢	-2SD～+2SD
0	15～154	26	146～336	52	78～213
1	23～186	27	141～328	53	77～212
2	32～213	28	137～320	54	76～211
3	40～227	29	133～312	55	75～210
4	48～238	30	129～304	56	74～208
5	56～252	31	126～297	57	73～207
6	69～287	32	122～290	58	72～205
7	89～357	33	119～283	59	71～203
8	111～438	34	115～277	60	70～201
9	133～517	35	112～271	61	69～198
10	155～588	36	109～265	62	68～196
11	175～638	37	106～260	63	66～194
12	188～654	38	103～254	64	65～191
13	193～643	39	100～250	65	64～188
14	193～625	40	98～245	66	62～186
15	192～614	41	95～240	67	61～183
16	192～611	42	93～236	68	60～180
17	191～599	43	90～233	69	59～177
18	188～574	44	88～229	70	57～175
19	182～539	45	87～226	71	56～172
20	175～499	46	85～224	72	55～170
21	168～459	47	83～221	73	54～167
22	161～425	48	82～219	74	53～165
23	155～397	49	81～218	75	52～163
24	151～375	50	80～216	76	50～160
25	147～358	51	79～215	77	49～158

（単位:ng/mL）